

# Instrucciones Inmediatas Dentadura

## Dentaduras inmediatas instrucciones postoperatorias

- Durante las primeras 24 horas de su dentadura inmediata no debe ser removido de su boca. Si la prótesis se elimina, la inflamación puede ocurrir que hará que sea difícil o imposible de reemplazar la prótesis.
- Después de 24 horas o el nombramiento predeterminado, verá a su dentista para un chequeo. En ese momento se le dará un nuevo conjunto de instrucciones para saber cómo cuidar de su dentadura y la boca.
- Después de las extracciones, no enjuague, escupir, fumar o chupar un clavo ardiendo. No se enjuague la boca con fuerza. No tomar bebidas calientes o bebidas carbonatadas. Consulte Extracción de las instrucciones postoperatorias para obtener información adicional sobre el cuidado de la boca después de la extracción del diente.
- Su dentadura inmediata no sólo reemplaza los dientes perdidos, pero está actuando para proteger la zona quirúrgica, controlar la hinchazón y sangrado de control. La prótesis tiene que estar en su lugar para ser eficaz.
- El ajuste de su dentadura inmediata cambiará su boca sana de la extracción de los dientes. Como se produce la curación, las crestas dentales cambiar de forma - y por lo general disminuye de tamaño. Una prótesis inmediata es a menudo solamente una prótesis temporal que requerirá el reemplazo o rebase después de la curación final de la boca.
- Los pacientes experimentan incomodidad, dificultad para comer y hablar puede ser encontrado. Mientras que algunas molestias a los pacientes dura unos pocos días otros pueden experimentar un período de tiempo más largo para adaptarse a su dentadura inmediata.
- La prótesis inmediata será necesario ajustar y / o rebasada para compensar los cambios que tendrán lugar en la boca como las encías sanan. Se le darán instrucciones de su dentista para volver a las citas periódicas para controlar su boca para los cambios que se requieren ajustes de prótesis.
- Después de los alvéolos de extracción dentales han cicatrizado (de dos a seis semanas) se puede encontrar una pasta de adhesivo para dentaduras postizas o en polvo para ayudar a estabilizar su dentadura.
- Tomas de extracción dental por lo menos 6 meses en sanar y rellenar con nuevo hueso de la mandíbula. En ese momento, su dentista le hablará sobre la sustitución de su prótesis inmediata con una prótesis permanente o realizar una rectificación permanente.
- Por favor, llámenos si necesita ayuda.